

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TUYÊN GIÁO**

*

Số 143-CV/BTGDUK

*về việc tăng cường tuyên truyền phòng,
chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: - Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng,
- Ban Thường vụ các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.

Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh dễ lây truyền từ người này sang người khác qua đường hô hấp. Những trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm độc, nhiễm trùng nặng, gây các tổn thương viêm cơ tim, nguy cơ tử vong cao. Bệnh được phòng bằng vắc xin, điều trị khỏi nếu được phát hiện kịp thời. Thời gian qua đã phát hiện một số trường hợp mắc bệnh bạch hầu ở hai tỉnh: Nghệ An và Bắc Giang, trong đó đã có trường hợp tử vong và nhiều trường hợp nghi ngờ do tiếp xúc gần với người bệnh, nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao.

Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đối với công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng; thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 2128-CV/BTGTU, ngày 17/7/2024 “*về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh*”, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị:

1. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động bằng các hình thức phù hợp (qua Website, Fanpage, trang tin nội bộ, mạng xã hội...) để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của bệnh bạch hầu; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và các biện pháp, giải pháp phòng, chống bệnh bạch hầu theo khuyến cáo của Bộ Y tế (*gửi kèm theo*).

2. Cấp ủy Đảng: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Đắk Lắk, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đồng thời với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền các khuyến cáo về phòng, chống bệnh bạch hầu tại cơ quan đơn vị, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên tham mưu triển khai tốt các nhiệm vụ, nội dung được nêu Công văn số 2128-CV/BTGTU, ngày 17/7/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhận được Công văn này, đề nghị cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ các đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên, (thực hiện)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, | (báo cáo)
- Thường trực Đảng uỷ Khối,
- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối.



Phan Quang Ngọc

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ **về phòng, chống dịch bệnh bạch hầu**

Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, nhưng người lớn cũng có thể mắc nếu không có miễn dịch. Vi khuẩn bạch hầu sản sinh ra độc tố gây tổn thương đường hô hấp trên và có thể lan ra toàn cơ thể, gây biến chứng nghiêm trọng. Bệnh bạch hầu thường gặp với những triệu chứng điển hình như: sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn. Sau 2-3 ngày, xuất hiện giả mạc mặt sau hoặc hai bên thành họng có màu trắng ngà, xám hoặc đen; giả mạc dai, dính, dễ chảy máu. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để phát hiện bệnh. Biến chứng nghiêm trọng của bệnh bạch hầu đó là giả mạc phát triển nhanh, lan tỏa xuống đường hô hấp gây ra tình trạng bí tắc đường hô hấp. Nguy cơ biến chứng nguy hiểm hơn đó là viêm cơ tim, bởi độc tố bạch hầu gây tác dụng mạnh đối với cơ tim. Nặng hơn nữa có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tử vong. Vi khuẩn bạch hầu lây lan từ người này sang người khác thường qua hô hấp, như khi ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra, bệnh có thể lây qua con đường gián tiếp khi tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm dịch từ người bệnh. Bệnh được phòng bằng vaccine, điều trị khỏi nếu được phát hiện kịp thời.

Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu: ComBe Five hoặc DPT-VGB-Hib (SII), Td đầy đủ, đúng lịch.
2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.
3. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.
4. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
5. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.

Lịch tiêm chủng vắc xin SII hoặc ComBe Five trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng:

Mũi 1: Tiêm khi trẻ được 2 tháng tuổi

Mũi 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng

Mũi 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng

Mũi 4: Khi trẻ 18 tháng tuổi.